

endigend. Thorakalschüppchen groß, gerundet, 2,5mal so lang wie die Flügelschüppchen; ihr Innenrand parallel zur Seite des Schildchens. p fein mit längeren Tarsen. Vorderkrallen ein wenig kürzer als das letzte Tarsalglied. Borsten der p außerordentlich klein. t_1 mit 1 pd und 1 hinteren ungefähr auf derselben Höhe, t_2 ohne ad, ohne Innenborste, mit 2 pd und 2 hinteren Borsten. t_3 mit 2 ad, 2 pd, 1 Innenborste, 2 dorsalen Endborsten. Posterointerner Endsporn klein.

♀ mit dem ♂ identisch. Vordertarsen nicht verbreitert. Krallen kaum kürzer als die beim ♂.

Wir kennen 4 Arten von *Eutrixopsis* Towns., davon 1 aus Süd- und Ostasien (*E. javana* Towns.) 2 aus Südafrika (*E. pallida* Villen. = *petiolata* Verbeke und *E. kufferathi* Verbeke) und 1 von Madagaskar (*E. hova* Villen. = *regnardi* Verbeke). *E. javana* Towns. unterscheidet sich leicht von *E. pallida* Villen. und *E. hova* Villen. durch ihren Flügel, mit auf dem Rande geschlossener R_5 (nicht gestielt) und ihre Wangen, die auf $\frac{1}{2}$ Höhe so breit sind wie $\frac{3}{4}$ der Breite des 3. Fühlerglieds (und nicht $\frac{1}{3}$). Schließlich ist *E. javana* Towns. außerordentlich nahe *E. kufferathi* Verb. Sie unterscheidet sich durch die Haare ihrer Wangen, die winzig und sehr kurz (nicht verlängert) sind.

Typische Art: *E. javana* Towns. durch Originaldesigna-tion.

***Eutrixopsis javana* Towns.** 1918 (Ins. Insc. Menstr. VI, p. 166).

Syn.: *paradoxa* Towns. 1927 (Ent. Mitt. XVI, p. 277). — cf. teste Malloch, 1932 (Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 10, Vol. X, p. 318).

♂: Kopf tabakbraun, rotbraun auf dem Peristom; er ist bedeckt von ziemlich dichter grauweißer Bereifung. Stirnstreifen rotbraun. Fühler, Taster und Fulcrum gelb. Thorax schwarzbraun, gelblich auf den Schultern und an den Seiten; er ist bedeckt von grauer Bereifung, die dorsal ziemlich dicht ist, wo 4 mattschwarze, ziemlich breite und diffuse Längsstreifen sichtbar werden. Schildchen braungelb. Abdomen gelb, mit schwärzlichem 5. Tergit. Ein diffuser brauner Gürtel findet sich am Hinterrand eines jeden der 2., 3. und 4. Tergite; ein schmaler brauner dorsaler Mittellängsstreifen geht über das ganze Abdomen. Sternite schwarzbraun. Genitalien bräunlich. Das Abdomen ist gleichmäßig bedeckt von einer sehr leichten grauen Bereifung, die nur bei Gegenlicht sichtbar ist. Flügel leicht braungelb, dunkler an ihrer Basis und ihrem Vorderrand. Epaulette gelbbraun, Basicosta gelb. Thorakalschüppchen ein wenig ölig graubraun. Schwinger gelb. p gelb, Pulvillen braungrau.

♀ dem ♂ ähnlich.

Länge: 6—7 mm. Flugzeit Sommer.

Eine nächtlich lebende Art, die in Asien, von Ceylon bis zum Fernen Osten, in China, Korea, Japan ziemlich gewöhnlich ist.

Wirt: Clausen hat sie aus den Imagines von *Popillia japonica* Newm. (Scarabaeidae) bei Sapporo (Hokkaido, Japan) gezogen.

Asia